



**Ospedale Spirito Santo**  
**CORRETTO UTILIZZO DEI GUANTI**

**IO 02 PO 01/562**

Rev 04/2014

Pag 1 di 3

**Proc. 3**

**REVISIONI**

<b>N°</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE REVISIONE/MODIFICA</b>	<b>Rif. PARAGR.</b>	<b>Rif. PAGINA</b>
00	13/10/06	1 <sup>a</sup> Emissione	Tutti	Tutte
01	27/04/09			
02	26/07/12			
03	30/09/13			

**APPROVAZIONE**

<b>RAQ UO</b>		<b>DIR UO</b>	
Firma	Data	Firma	Data

<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	Definire univoche modalità di utilizzo dei guanti al fine di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi di cui è portatore il paziente.</li><li>• Ridurre i rischi di trasmettere al paziente la flora batterica abituale e di contaminazione da un paziente all'altro.</li></ul>
<b>RIFERIMENTI</b>	Istruzioni dei presidi L. 81/2008 e SMEI
<b>INFRASTRUTTURE E DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E DI MISURAZIONE</b>	
• Guanti sterili	• Guanti non sterili
<b>RESPONSABILITÀ</b>	
<b>RAQ UO</b>	Rende disponibile il protocollo al personale; Promuove la diffusione della conoscenza del protocollo; Propone le revisioni; Effettua attività di controllo sul personale in merito alla corretta applicazione del protocollo;
<b>Personale UO</b>	Applica le indicazioni fornite dal protocollo; Propone le revisioni; Si sottopone alla valutazione.



**Classificazione dei guanti**

<b>Guanti forniti dall' azienda</b>	<b>Attività</b>	<b>Guanti alternativi per l'operatore</b>
<i>Guanti chirurgici sterili in lattice con talco.</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interventi chirurgici</li><li>• Medicazioni</li><li>• Indagini strumentali</li><li>• Cateterismo vescicale</li></ul>	Guanti chirurgici sterili in lattice non talcati: a secondo del tipo e della gravità della patologia presente nell'operatore; dietro prescrizione del Medico del Lavoro.
<i>Guanti non sterili in lattice.</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medicazioni e cure igieniche</li><li>• Prelievi ematici</li><li>• Manipolazione di materiale biologico</li><li>• Raccolta biancheria sporca</li><li>• Manipolazione di rifiuti ospedalieri</li><li>• Decontaminazione e detersione ferri chirurgici</li><li>• Broncoaspirazione</li><li>• Manipolazione padelle</li><li>• Attività domestico alberghiere</li></ul>	Guanti non sterili in vinile (da preferirsi a quelli in lattice); Guanti non sterili in lattice non talcati: a secondo del tipo e della gravità della patologia presente nell'operatore; dietro prescrizione del Medico del Lavoro
<i>Guanti in polietilene sterili.</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medicazioni</li></ul>	A secondo del tipo e della gravità della patologia presente nell'operatore.
<i>Guanti da cucina personalizzati.</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulizie ambiente</li><li>• Lavaggio strumenti</li><li>• Lavaggio stoviglie</li><li>• Attività alberghiere</li></ul>	
<i>Guanti sterili in neoprene.</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preparazione di farmaci antiblastici (attività sotto cappa)</li></ul>	
<i>Guanti non sterili in neoprene.</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preparazione di farmaci antiblastici (attività di supporto).</li></ul>	

**N.B.**

- **Si evidenzia la possibilità di avere in dotazione i guanti antitaglio;**
- **I guanti in filo sono indicati per casi di dermatite irritativa, ma non sono validi per allergia al lattice.**

**Procedura utilizzo guanti sterili**

- Lavaggio antisettico delle mani;
- Indossare i guanti sterili secondo la tecnica (Allegato 01);
- Eseguire la prestazione;
- In caso di intervento chirurgico i guanti vanno sostituiti ogni due ore, in **caso di preparazione di farmaci antiblastici ogni 30 minuti**;
- Sfilare i guanti e smaltirli;
- Lavaggio sociale delle mani.

**N.B.**

- Nel caso in cui i guanti sterili si dovessero bucare o strappare vanno sostituiti.
- Qualora si verifici un contatto accidentale con materiale non sterile è necessario ripetere la procedura partendo dal lavaggio antisettico delle mani.

	<b>Ospedale Spirito Santo</b> <b>CORRETTO UTILIZZO DEI GUANTI</b>	<b>IO 02 PO 01/562</b>
		Rev 04/2014
		Pag 3 di 3
		<b>Proc. 3</b>

### **Procedura utilizzo guanti non sterili**

- Lavaggio sociale;
- Scegliere i guanti della giusta misura;
- Indossare i guanti prima di toccare sangue, liquidi corporei, secreti, escreti, mucose, cute non integra e oggetti contaminati;
- Sostituire i guanti nel corso di manovre o procedure ripetute sullo stesso paziente dopo il contatto con materiale che può contenere una elevata concentrazione di microrganismi;
- Cambiare i guanti in caso di dubbio circa l'integrità degli stessi e lavarsi le mani prima di indossarne di nuovi;
- **Non toccarsi gli occhi, il naso, la bocca, i capelli e la cute;**
- **Non toccare attrezzature, telefono, porte e strumenti vari;**
- Non allontanarsi dal luogo di lavoro indossando i guanti;
- Rimuovere prontamente i guanti dopo l'uso che deve essere limitato allo stretto indispensabile;
- Sfilare i guanti e smaltirli.

### **N.B.:**

- **Sostituire i guanti se lesionati;**
- **Non riutilizzare i guanti monouso.**

### Eccezioni

La modalità di vestizione dei guanti sterili all'interno del Blocco Operatorio viene effettuata mantenendo la confezione in mano, senza appoggiarla su un piano.