

# Trattamento e gestione del paziente con sepsi

Modified Early Warning Score (MEWS)

Score	3	2	1	0	1	2	3
AVPU	-	-	-	A	V	P	U
Fr Resp	-	<9	-	9-14	15-20	>21	>30
Fr Card	-	<40	41-50	51-100	101-110	111-120	>130
PAS	<70	71-80	81-100	101-109	-	>200	-
Temp	-	<35	-	35-38.4	-	>38.5	-

**Segni di infezione:**

- Tosse, catarro, dolore toracico
- Dolore addominale, distensione addominale, diarrea
- Disuria, disturbi apparato genitale
- Cefalea, rigidità nucale, alterazione della coscienza
- Disturbi ORL
- Cellulite, corpo estraneo, ferita
- Artrite
- Endocardite
- Presenza di dispositivo intravascolare

**Segni di insufficienza d'organo:**

- PAS < 90 o PAM < 65 o riduzione PAS > 40 mmHg;
- SpO<sub>2</sub> < 90% o PaO<sub>2</sub>/FIO<sub>2</sub> < 300;
- Diuresi < 0.5 ml/kg/h per 2 ore o creatinina < 2 mg/dl o > 50% basale;
- Bilirubina > 2 mg/dl o transaminasi > 2 volte limite superiore;
- INR > 1.5 o aPTT > 60 s o PLT < 100.000/mm<sup>3</sup>;
- Lattati > 2 mmol/l o BE ≥ 5 mEq/L.



