



Data  /  /

## SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE


Cognome

Nome

### TIPO LESIONE:

- Lesione da decubito  
 Ulcera venosa     Ulcera arteriosa     mista ( \_\_\_\_\_ )  
 Ulcera diabetica:    - arteriopatica    - neuropatica  
 altro \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_



### STADIAZIONE

- I stadio  
 II stadio  
 III stadio  
 Escara

teste			
Solco intersgluteo			
Gluteo dx	Gluteo sin	Cresta tibiale dx	Cresta tibiale sin
Trocantere dx	Trocantere sin	Gamba dx	Gamba sin
Ischio dx	Ischio sin	Malleolo interno dx	Malleolo interno sin
Cresta iliaca dx	Cresta iliaca sin	Malleolo esterno dx	Malleolo esterno sin
Genocchio dx	Genocchio sin	Tallone dx	Tallone sin
altro		altro	

Wound bed score			
Caratteristiche del letto	0	1	2
Bordi in via di guarigione	No	75-99%	> 75%
Escara nera	> 25% dell'area della lesione	0-25%	Assente
Profondità/granulazione	Severamente depresso o rialzato se comparato con la cute circostante	Moderato	Pareggiato o quasi
Quantità di esudato	Severo	Moderato	Lieve o assente
Edema	Severo	Moderato	Lieve o assente
Devastate perilesionarie	Severo	Moderato	Minima o assente
Borde callous/fibrosi	Severo	Moderato	Minima o assente
Letto della ferita rosa	Necrosi/fibrina	50-75%	> 75%
Punteggio 0 - 16	Valore rilevato =		

Cute perilesionale		
X	MANIFESTAZIONE	Definizione
	normale	La cute non presenta nessun segno di sofferenza, si presenta ben idratata ed idrolata
	macerazione	Contatto prolungato nel tempo con liquidi che determinano alterazione del pH e della struttura della cute
	Prurito	Aumento della pelle determinato dall'aumentata vasodilatazione del derma superficiale
	Edema	Accumulo di liquido in un punto ben circoscritto
	Infiammazione o flogosi	Complesso dei processi locali con i quali l'organismo risponde all'azione di agenti nocivi per i tessuti
	Secca	Desquamazione superficiale che in alcuni casi estremi evolve verso la xerosi con ragadi. La cute secca è molto facilmente aggredibile, può essere responsabile di sensibilizzazione e dermatite da contatto allergica
	Papule	Lesione rilevata, circoscritta di dimensioni inferiori al cm non contenente liquido
	Flette	Accumulo di liquido in un punto ben circoscritto. Si formano per un'inflammatione della pelle. Possono avere dimensioni che vanno da una gocciolina prelacra fino a bolle di parecchi centimetri
	Prurito	Tipica situazione di fastidio dermatico, per cui viene spontaneo grattarsi la pelle, in certi casi eccessivamente, arrivando addirittura a creare delle vere e proprie ferite, possibili cause di infezioni



**DIMENSIONI:**

LARGHEZZA cm \_\_\_\_\_ ALTEZZA cm \_\_\_\_\_ VOLUME cc \_\_\_\_\_

Parametri infezione	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
<input type="checkbox"/> essudato purulento		
<input type="checkbox"/> aumento essudazione		
<input type="checkbox"/> aumento dimensioni ulcera		
<input type="checkbox"/> arresto guarigione		
<input type="checkbox"/> comparsa/aumento dolore		
<input type="checkbox"/> odore nauseabondo		
<input type="checkbox"/> fragilità/facile sanguinamento del fondo		
<input type="checkbox"/> colore verdastro		
<input type="checkbox"/> linfangite		
<input type="checkbox"/> cellulite		

**Valutazione del dolore**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Valutazione dolore da cambio di medicazione**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Valutazione dolore da medicazione**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**MEDICAZIONE**

Presidio	
Frequenza	

**BENDAGGIO**

E si

E no

<input type="checkbox"/> Terapia compressiva	
<input type="checkbox"/> Bendaggio multistrato	
<input type="checkbox"/> Calza elastica	
<input type="checkbox"/> Altro	

**ESSUDATO**

0	Assenza di essudato, lesione secca, presenza di crosta
1	Totalmente controllato, quantità nulla-poca, non richiede medicazioni assorbenti oppure la medicazione può rimanere in sede fino ad 1 settimana
2	Parzialmente controllato, quantità moderata, la medicazione può essere cambiata ogni 2-3 giorni
3	Non controllato, ferita iperessudante, è richiesto un cambio di medicazione assorbente 1 o più volte al giorno

