



UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

Via Paolini, 47- 65124 - PESCARA
Palazzina F Ingresso 1 (Palazzo della Direzione Generale)
Tel. 085.425.3203/04/62
comunicazioneistituzionale@ausl.pe.it;
info.cup@ausl.pe.it

Comunicato stampa

Pescara, 22 ottobre 2021

Giorni e orari di apertura dei Centri Vaccinali anti Covid-19 della ASL di Pescara

Si riportano di seguito i giorni e gli orari di apertura dei Centri Vaccinali della ASL di Pescara – Città Sant'Angelo, Penne e Scafa – dove effettuare la vaccinazione anti Covid-19 (I, II e III dose) da oggi **20 ottobre al 30 ottobre 2021**.

Città Sant'Angelo Village Outlet, via Moscarola Città Sant'Angelo, "Ingresso D":
aperto **dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 19.30.**

Penne, Contrada Campetto:
aperto **il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.**

Centro Vaccinale Val Pescara – Scafa, Area ex cementificio:
aperto **il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.**

Presso le sedi:

- ✓ È possibile accedere anche senza prenotazione.
- ✓ Possono recarvisi anche i sanitari per la III dose.
- ✓ È possibile effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale.

Le persone che hanno fissato un appuntamento per la vaccinazione, o che spontaneamente si recano presso uno dei Centri indicati, sono pregate di recarsi rispettando gli orari, di stampare il modulo unico di consenso informato e la scheda anamnestica (cioè la scheda che riporta le condizioni di salute e i farmaci assunti) compilarlo in ogni parte e presentarlo al personale del centro vaccinale. In questo modo si potranno accelerare di molto le procedure di registrazione, consenso e rilascio di attestazione, e ridurre al minimo i tempi di permanenza nei locali.

Il modulo, il link per la prenotazione, e le informazioni sulla vaccinazione anti Covid-19 sono disponibili alla pagina:

<https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19&idSezione=1420> del sito web aziendale.



UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

Via Paolini, 47- 65124 - PESCARA
Palazzina F Ingresso 1 (Palazzo della Direzione Generale)
Tel. 085.425.3203/04/62
comunicazioneistituzionale@ausl.pe.it;
info.cup@ausl.pe.it

Nella **Circolare del Ministero della Salute dell'8 ottobre 2021**, "*indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi "booster" nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2/COVID-19*", tempestivamente pubblicata sul sito della ASL di Pescara al link:

<https://www.asl.pe.it/allegati/percorsi/cittadini/covid19/Circolare%20aggiornamento%20terze%20dosi.pdf>

sono fornite tutte le indicazioni dei destinatari della III dose di vaccino anti Covid-19, distinte in

- **dosi addizionali**,
- **dosi booster**

Per **dose addizionale** si intende una dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo vaccinale primario, somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria. La dose addizionale è da eseguirsi, **dopo almeno 28 giorni dall'ultima dose**, per i soggetti sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici.

In particolare per le seguenti condizioni:

- Trapianto di organo
- Trapianto di cellule staminali ematopoietiche
- Attesa di trapianto d'organo
- Terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T)
- Patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure
- Immunodeficienze primitive (es. Sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.)
- Immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es. terapia corticosteroidica ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.)
- Dialisi e insufficienza renale cronica grave
- Progredita splenectomia
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200 cellule/ μ l o sulla base di giudizio clinico



UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

Via Paolini, 47- 65124 - PESCARA
Palazzina F Ingresso 1 (Palazzo della Direzione Generale)
Tel. 085.425.3203/04/62
comunicazioneistituzionale@ausl.pe.it;
info.cup@ausl.pe.it

Per **dose “booster”** si intende una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, da somministrare **dopo almeno 6 mesi dall'ultima dose**, al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, in particolare in popolazioni connotate da un **alto rischio**, per **condizioni di fragilità** che si associano allo sviluppo di malattia grave, o addirittura fatale, o per **esposizione professionale** (sanitari etc.).