



RACCOMANDAZIONI PER UN USO APPROPRIATO E SICURO DEI DPI PER LA PROTEZIONE DEGLI OPERATORI DAL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL SARS-COV-2

**ASL PESCARA
Revisione 0
Versione 1**

del 12/03/2020

**RACCOMANDAZIONI PER UN USO APPROPRIATO E SICURO DEI DPI
PER LA PROTEZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI DAL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL SARS-COV-2**

Nel D.Lgs.vo 81/2008, art. 74, si definisce DPI *qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta principalmente dal lavoratore con lo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.*






La Direzione Sanitaria della ASL di Pescara, pertanto, nel pieno rispetto dei principi fondamentali enunciati dalla Normativa italiana ed europea in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, **ritiene fondamentale, anche in occasione dell’Emergenza Covid-19, dotare i propri Operatori di sistemi di protezione individuale:**

1. rispondenti alla **migliore scienza ed esperienza** del momento storico (art.15 D.Lgs.vo 81/2008);
2. rispondenti al Principio della **massima sicurezza tecnicamente fattibile** (art.15 D.Lgs.vo 81/2008| art. 2087 codice civile);
3. in grado di garantire la protezione dall’esposizione diretta, e indiretta, a secrezioni respiratorie potenzialmente infette da Sars-Cov-2 trasmissibili tramite modalità **droplet/contatto**;
4. il cui utilizzo è raccomandato in base al livello di esposizione al rischio: **tipologia di contatto (diretto o indiretto) e di attività/procedura da svolgere.**

Si ribadisce, con l’occasione, che i **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) rappresentano Misure precauzionali aggiuntive** alle Misure precauzionali standard che devono essere sempre attuate nella gestione di un contatto a rischio di trasmissione di agenti patogeni come, nel caso specifico, di Sars-Cov-2, quali:

- frequente ed accurata igiene delle mani (lavaggio sociale delle mani con acqua e soluzione detergente) o frizionamento delle mani, non visibilmente sporche o contaminate da materiale organico, mediante l’uso di gel idroalcolico
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con mani non pulite o guantate
- osservare, possibilmente, una distanza di sicurezza compresa tra 1 e 2 metri da soggetti con sintomi respiratori.

**DPI DA UTILIZZARE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA DI "CONTATTO" E DI ATTIVITA'/PROCEDURA DA SVOLGERE**

| I° scenario | II° scenario | III° scenario |
|--|---|---|
| <p>CONTATTO INDIRETTO (distanza > 1 metro) con caso "sospetto" o "accertato" da Covid-19 <u>che indossa</u> Mascherina chirurgica</p> <p style="text-align: center;"></p> | <p>CONTATTO DIRETTO (< 1 metro) con caso "sospetto" o "accertato" da Covid-19 <u>che indossa</u> Mascherina chirurgica</p> <p style="text-align: center;"></p> | <p>CONTATTO DIRETTO (< 1 metro) con caso "sospetto" o "accertato" da Covid-19 sottoposto a Procedure in grado di generare aerosol come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> intubazione tracheale <input type="checkbox"/> ventilazione invasiva <input type="checkbox"/> tracheostomia <input type="checkbox"/> rianimazione cardiopolmonare <input type="checkbox"/> ventilazione manuale prima dell'intubazione <input type="checkbox"/> broncoscopia <p style="text-align: center;"></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cappellino chirurgico monouso - Facciale filtrante FFP3 - Occhiali di protezione a maschera o Visiera protettiva (pluriuso, da sanificare dopo l'uso) - Guanti chirurgici monouso (2 paia, vedi Procedura aziendale vestizione DPI) - Camice chirurgico monouso DPI |
| <p>- Non richiesti DPI - Nel caso, Mascherina chirurgica monouso</p> | <p>- Mascherina chirurgica monouso - Guanti chirurgici monouso - Camice protettivo monouso</p> | |
| <p>CONTATTO INDIRETTO (distanza > 1 metro) con caso "sospetto" o "accertato" da Covid-19 che NON indossa Mascherina chirurgica</p> <p style="text-align: center;"></p> | <p>CONTATTO DIRETTO (< 1 metro) con caso "sospetto" o "accertato" da Covid-19 che NON indossa Mascherina chirurgica</p> <p style="text-align: center;"></p> | |
| <p>Mascherina chirurgica monouso</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Facciale filtrante FFP2 - Occhiali di protezione a maschera o Visiera protettiva (pluriuso, da sanificare dopo l'uso) - Camice protettivo monouso - Guanti chirurgici monouso | |

| | |
|--|---|
| <p>Personale UOC Microbiologia che effettua Test Covid-19</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Facciale filtrante FFP3 - Occhiali di protezione a maschera o Visiera protettiva (pluriuso, da sanificare dopo l'uso) - Guanti chirurgici monouso - Camice chirurgico monouso DPI |
|--|---|

BIBLIOGRAFIA

- OMS Interim guidance. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). 27 February 2020
- ECDC Technical Report. Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19. February 2020.
- OMS Interim guidance. Advice on the use of masks the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. 29 January 2020.
- Ministero della Salute. Circolare ministeriale n° 5443 del 22/02/2020 avente ad oggetto: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti.
- INMI Spallanzani di Roma. Procedure operative per la gestione di casi sospetti, probabili o confermati e contatti di infezione respiratoria da Coronavirus emergent (Middle-east Respiratory Syndrome, MERS; Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS; Wuhan Novel Coronavirus, 2019-nCoV). Rev. 0 del 28/01/2020.