

RACCOMANDAZIONI PER IL CONTROLLO DELLA TRASMISSIONE DEI MICRORGANISMI "ALERT" (MDR) NELLE UU.OO./SERVIZI DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELLA ASL PESCARA

<p>1. ACCURATA IGIENE ED ANTISEPSI DELLE MANI</p>	<p>Prima e dopo il contatto con il paziente e con le superfici ambientali circostanti e, comunque, prima di effettuare qualsiasi manovra assistenziale.</p>
<p>2. UTILIZZO DEI GUANTI</p>	<p>Prima del contatto con il paziente, con i suoi liquidi biologici, con i devices di cui è portatore e, comunque, sempre prima di effettuare manovre assistenziali. Indossare i guanti sempre dopo aver eseguito un accurato lavaggio e/o antisepsi delle proprie mani.</p>
<p>3. UTILIZZO DI ALTRI DPI in base al sito interessato dalla colonizzazione/infezione e al meccanismo di trasmissione degli agenti patogeni riscontrati</p>	<p>Camice protettivo (per infezioni trasmissibili per Contatto) Facciale filtrante (FFP2 o FFP3 per infezioni trasmissibili attraverso Droplet o via Aerea) Occhiali protettivi (per infezioni trasmissibili per Contatto con schizzi/spruzzi di liquidi biologici potenzialmente infetti)</p>
<p>4. NON INDOSSARE anelli, monili, orologi e NON applicare smalto per unghie e unghie artificiali</p>	<p>Rappresentano ricettacolo di sporco e di microrganismi che vi si annidano, si moltiplicano e che diventano più difficili da rimuovere per la formazione di biofilm.</p>
<p>5. PRIVILEGIARE L'USO di Dispositivi Medici monouso o dedicati (da ricondizionare dopo l'uso)</p>	<p>Per ridurre il rischio di trasmissione crociata delle infezioni.</p>
<p>6. ELIMINARE LE CONFEZIONI "APERTE" DI PRODOTTI DETERGENTI, ANTISETTICI, DISINFETTANTI IN USO, SOSTITUENDOLE con NUOVE debitamente etichettate e riportanti la data di apertura del prodotto</p>	<p>Tale raccomandazione è valida sempre per ridurre il rischio di contaminazione dei prodotti detergenti, antiseptici e disinfettanti a base acquosa (e non alcolica), che risultano essere più facilmente contaminabili, e in presenza di cluster epidemici (più casi di colonizzazione/infezione).</p>
<p>7. GESTIRE LA BIANCHERIA DEL LETTO come potenzialmente infetta</p>	<p>Rimuoverla dal letto con attenzione (evitando di scuoterla) ed inserirla all'interno dei sacchi rossi contenenti, ciascuno, sacchi trasparenti idrosolubili, da inviare poi al lavaggio.</p>
<p>8. SMALTIRE I RIFIUTI SANITARI POTENZIALMENTE INFETTI negli appositi contenitori per rifiuti speciali a rischio infettivo</p>	<p>Per ridurre il rischio di trasmissione dei microrganismi patogeni a livello ambientale.</p>
<p>9. RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI IGIENE AMBIENTALE, quotidiane e terminali, su tutte le superfici orizzontali e verticali</p>	<p>Attraverso segnalazione del rischio specifico alla Ditta di pulizie (compilare Schede appositamente predisposte ed inviarle). Verificare la corretta implementazione delle procedure di sanificazione ambientale previste, sulla base del meccanismo di trasmissione dell'infezione, nella Procedura aziendale denominata "Procedure di sanificazione ambientale da implementare in presenza di casi di colonizzazione/infezione da microrganismi alert".</p>
<p>10. FORNIRE INFORMAZIONI ADEGUATE al PAZIENTE colonizzato e/o infetto, ai FAMILIARI e/o ai CAREGIVERS sui comportamenti e sulle Misure precauzionali da adottare</p>	<p>Al fine di favorire l'implementazione uniforme delle Misure di contenimento dei casi a tutela della salute e della sicurezza degli altri pazienti ricoverati.</p>