

-
- 1 **Il CVC nei pazienti dializzati viene collocato nella vena:**
- A** nessuna delle altre alternative è corretta
 - B** giugulare
 - C** omerale
 - D** succlavia
-
- 2 **Il virus del vaiolo, in Italia, provoca ogni anno:**
- A** nessun morto
 - B** 100 morti
 - C** nessuna delle altre alternative è corretta
 - D** 10 morti
-
- 3 **Le AFT, aggregazioni funzionali territoriali, operano in un territorio definito come:**
- A** nessuna delle organizzazioni citate nelle altre alternative
 - B** appendice del Distretto Sanitario di Base
 - C** corollario alle attività organizzate in una UCCP
 - D** autonoma organizzazione dei nuclei di cure primarie
-
- 4 **Quale posizione nel sonno si è dimostrata più associata alla SIDS:**
- A** supina con spalle sollevate
 - B** prona
 - C** decubito laterale destro
 - D** decubito laterale sinistro
-
- 5 **L'ecocardio transesofageo necessita di:**
- A** mezzo di contrasto baritato
 - B** nessuna particolare sostanza di contrasto
 - C** carico di acqua
 - D** mezzo di contrasto iodato
-
- 6 **I pazienti con infezioni in corso richiedono generalmente una dieta:**
- A** iperlipidica
 - B** con alto contenuto proteico e calorico
 - C** ricca di fibre
 - D** con basso contenuto proteico e calorico
-
- 7 **La sonda Miller-Abbot è una sonda:**
- A** rettale
 - B** a singola via, lunga 50 cm
 - C** a doppia via, lunga 50 cm
 - D** a doppia via, lunga 300 cm

- 8 Il catetere venoso centrale deve essere necessariamente inserito in:
- A sala operatoria
 - B ambiente normalmente igienizzato
 - C ambiente sterile con metodica MSB
 - D nessuna delle altre situazioni ambientali elencate è corretta

- 9 Con il termine "Pollachiuria" si intende:
- A minzione involontaria
 - B elevata frequenza delle minzioni
 - C elevata quantità di urina prodotta
 - D minzione dolorosa e difficoltosa

- 10 La lebbra è una malattia provocata da quale dei seguenti microrganismo?
- A Pasteurella
 - B Xilella
 - C Brucella
 - D Mycobacterium

- 11 Nel paziente etilista, la sospensione dell'assunzione di alcool causa:
- A stato di euforia dopo 5-10 ore
 - B bradipnea, ipotensione entro 5-10 giorni
 - C sonnolenza e ipotensione immediata
 - D delirium tremens dopo 3-5 giorni

- 12 La PEG è una misura adatta a superare un'inabilità alimentare:
- A dei motulesi
 - B superiore a 30 giorni
 - C dei pazienti affetti da inappetenza
 - D tutte le altre alternative sono corrette

- 13 In un paziente in decubito laterale obbligato, le lesioni da decubito si possono formare in corrispondenza di:
- A orecchio, coste, trocantere
 - B orecchio, coste, grande trocantere, condili, malleoli
 - C osso parietale, cresta iliaca, malleoli
 - D zigomi, scapole, gomiti, talloni

- 14 Il Presidio Ospedaliero di Pescara è classificato come:
- A Centro Traumatologico Ortopedico
 - B Centro Traumatologico ad alta Specializzazione
 - C nessuna delle altre alternative è corretta
 - D Centro Ematologico Regionale

- 15 **Che cosa si intende per immunità di gregge?**
- A** Immunizzazione attorno al 75% della popolazione umana
 - B** Profilassi della popolazione ovino-caprina
 - C** Immunizzazione del 95% della popolazione umana
 - D** Immunizzazione a seguito di vaccinazione in una popolazione animale
-
- 16 **La malattia di Hirschsprung è una:**
- A** cardiopatia congenita
 - B** malattia respiratoria rara
 - C** malattia congenita del colon
 - D** malattia infantile che porta a ritardo nella crescita
-
- 17 **Con riferimento ai cateteri vescicali, quale delle seguenti alternative è ERRATA?**
- A** La scala di misurazione è quella di French
 - B** Maggiore è il diametro del lume, maggiore è il numero del catetere
 - C** Maggiore è il diametro del lume, minore è il numero del catetere
 - D** I numeri della scala di misurazione corrispondono al diametro del lume
-
- 18 **Un paziente è sottoposto a NPT tramite CVC. Gli viene prescritta una terapia antibiotica per via endovenosa; quale atto deve compiere l'infermiere prima di somministrare il farmaco?**
- A** Procedere a un prelievo ematico
 - B** Posizionare un accesso venoso separato per somministrare il farmaco
 - C** Sospendere la NPT per 30 minuti prima della terapia antibiotica
 - D** Eseguire un lavaggio con soluzione fisiologica prima di somministrare antibiotico
-
- 19 **La dimissione protetta è valutata in sede ospedaliera con la seguente modalità:**
- A** dimissione dall'unità ospedaliera, comunicazione al Distretto
 - B** interpellò della UVM distrettuale, decisione congiunta alla presenza del caregiver
 - C** nessuna delle altre modalità elencate è corretta
 - D** trasferimento al domicilio del paziente e comunicazione alla UVM distrettuale
-
- 20 **Secondo l'attuale normativa, l'uso del defibrillatore semiautomatico è consentito:**
- A** ai soli medici
 - B** solo a medici, infermieri e personale sanitario addestrato
 - C** a medici, infermieri e personale, anche non sanitario, addestrato
 - D** a medici e infermieri nella struttura sanitaria
-
- 21 **Il servizio infermieristico è:**
- A** l'insieme delle funzioni effettuate dal personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione
 - B** l'insieme del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione
 - C** l'attività svolta da un infermiere
 - D** l'insieme del personale, delle funzioni e delle prestazioni effettuate dal personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai vari livelli di responsabilità e nei diversi ambiti aziendali

-
- 22 **Nella legislazione sanitaria, chi individua i Lea?**
- A** Il Governo, attraverso la conferenza Stato-Regioni
 - B** L'azienda sanitaria, attraverso l'atto aziendale
 - C** La Regione, attraverso il PSR
 - D** Nessuna delle altre alternative è corretta
-

- 23 **Il TSO, trattamento sanitario obbligatorio in psichiatria, è richiesto perchè il paziente:**
- A** è pericoloso per sé e per gli altri
 - B** nessuna delle altre condizioni elencate è corretta
 - C** è una minaccia per la collettività
 - D** non vuole curarsi
-

- 24 **Il Manometro di Claude serve per la misurazione della pressione:**
- A** endocranica
 - B** arteriosa
 - C** venosa
 - D** atmosferica delle sale operatorie
-

- 25 **L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è stata introdotta nella pratica assistenziale:**
- A** da una legge dello Stato del 1978
 - B** dall'autonomia programmatica assegnata alle Regioni nel 2005
 - C** dalla definizione dei Livelli essenziali di assistenza operata nel 2008
 - D** dalla Costituzione della Repubblica Italiana
-

- 26 **La sede elettiva per la somministrazione di insulina è:**
- A** regione antero-laterale della coscia
 - B** regione deltoidea
 - C** regione addominale
 - D** tutte le altre alternative sono corrette
-

- 27 **Il protocollo operativo denominato "Sistema Dispatch" è utilizzato per:**
- A** la gestione dei soccorsi in 118 nei grandi eventi catastrofici
 - B** tutti i casi elencati nelle altre alternative
 - C** la gestione dei soccorsi in 118 e per le afferenze in ospedale
 - D** le maxi emergenze traumatologiche
-

- 28 **Il virus Chikungunya provoca una malattia infettiva trasmessa con:**
- A** alimenti tropicali
 - B** puntura di zanzara
 - C** rapporti sessuali
 - D** puntura di ragno
-

- 29 **Le Unità complesse di cure primarie sono strutture operative che prevedono l'impegno di:**
- A** medici di medicina generale associati
 - B** medici specialisti ambulatoriali, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, infermieri
 - C** medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri ed infermieri pediatrici
 - D** solo specialisti ambulatoriali, pediatri di libera scelta

- 30 **Un bambino di sei anni rientra in ORL dopo un intervento di tonsillectomia. In quale posizione l'infermiere deve collocarlo nel letto?**
- A** In posizione prona
 - B** In qualsiasi posizione
 - C** In posizione supina
 - D** In posizione SIMS

Il superamento della prova scritta (questionario) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di **almeno 16/30** (art. 8 del Bando indetto in esecuzione della deliberazione n. 510 del 08/06/2017).

CRITERI DI VALUTAZIONE QUESTIONARIO

Il questionario è composto da 30 domande ciascuna corredata da n.4 risposte alternative delle quali una sola è esatta.

Ai singoli quesiti sono attribuiti i seguenti punteggi:

- un punto (+1) per ogni risposta esatta;
- zero punti (0) per ogni risposta errata, omessa o in caso di marcature multiple.